

薬には効果(ベネフィット)だけでなく副作用(リスク)があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：ブレーザベスカプセル100mg

主成分：ミグルスタット (Miglustat)

剤形：白色のカプセル剤、長径14mm、短径6.5mm

シート記載：(裏) ブレーザベス カプセル 100mg、BRAZAVES capsules 100mg



この薬の作用と効果について

グルコシルセラミド合成を阻害することにより、脳に脂質が過剰に蓄積するのを抑えて眼球の動き、食べ物の飲み込み、歩行、知能などの障害を改善します。

通常、ニーマン・ピック病C型の治療に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。
- 妊娠、授乳中または妊娠している可能性がある。
- 他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- あなたの用法・用量は(医療担当者記入)
- 通常、成人は1回2カプセル（主成分として200mg）を1日3回服用し、小児では体表面積に合わせて 0.47m^2 以下では1回1カプセルを1日1回、 0.47m^2 を超え 0.73m^2 以下では1回1カプセルを1日2回、 0.73m^2 を超え 0.88m^2 以下では1回1カプセルを1日3回、 0.88m^2 を超え 1.25m^2 以下では1回2カプセルを1日2回、 1.25m^2 を超える場合は1回2カプセル1日3回服用します。症状により適宜減量されます。必ず指示された服用方法に従ってください。
- 飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は忘れた分は飲まないで、通常の服用時間に1回分を飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

生活上の注意

- ふらつきが起こることがありますので、自動車の運転や機械の操作は避けてください。
- 腎臓に障害のある人は、使用量の調節のために、定期的に腎臓の働きを調べます。指定された日時に検査を受けてください。
- この薬の使用中は、副作用を見つけるためにも、定期的に神経の検査、血液検査、成長期の患者さんは身長および体重の測定が行われます。その場合には指定された日時に検査を受けてください。
- 男性で受胎を希望する場合には、医師に相談してください。

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、下痢、腹部の張り、腹痛、食欲減退、嘔吐、腹部不快感、体重減少、ふるえ、眠気、痙性麻痺（筋肉のつっぱり、こわばりや麻痺）、発疹、睡眠障害、甲状腺機能低下症（寒がり、顔全体のむくみ）などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- 水のような便、泥状の便、激しい腹痛[重度の下痢]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法その他

- 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

医療担当者記入欄 年 月 日