

くすりのしおり

注射剤

2017年03月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：エポプロステノール静注用 1.5mg 「ACT」

主成分：エポプロステノールナトリウム (Epoprostenol sodium)

剤形：注射剤

シート記載：



この薬の作用と効果について

肺の血管を拡げることによって、肺動脈の圧を下げ、同時に肺動脈を流れる血液の量をふやし息切れや疲労感を改善します。肺の血管内で血液の塊ができるのを防ぐことによって、血管が詰まらないようにします。通常、肺動脈性肺高血圧症の治療に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。心機能障害、低血圧がある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（：医療担当者記入）
 - ・通常、持続して静脈内に注射します。
- 具体的な使用期間については、担当の医師にお聞きください。

生活上の注意

- ・注射部位からの感染症があらわれることがあるので、注射部位を清潔に保ってください。

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、潮紅、動悸、下痢、腹痛、吐き気、嘔吐、顎痛、関節痛、頭痛、手のしびれ、感覚鈍麻、出血、発疹、胸がしめつけられる感じなどが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・立ちくらみ、めまい、顔面蒼白 [過度の血圧低下、過度の徐脈、意識喪失などのショック状態、尿量減少]
- ・体動時の動悸、呼吸困難、起坐呼吸 [肺水腫]
- ・発汗、体重減少、頻脈 [甲状腺機能亢進症]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。