

オプスミット[®]錠10mg を服用される方へ

オプスミット[®]錠10mgは、あなたの病気を治療するためのお薬です。この薬は、肺動脈の緊張を和らげることにより肺動脈圧を下げ血液を流れやすくする働きがあります。しかし、人によっては目的の効果以外の望ましくない作用（副作用）があらわれることがあります。

あなたに適切な治療を受けていただくために、下記の注意事項をよくお読みになり、必ずお守りください。

－ 注意事項 －

主治医や薬剤師の指示をしっかりと守って服用して下さい。

この薬について、次の事項を必ずお守りください

- 妊娠する可能性のある方へ
胎児に影響を与えるおそれがあります。
服用前および服用中は毎月、妊娠検査を受けてください。
この薬を服用中および服用中止後1ヵ月間は妊娠しないよう十分注意してください。
服用中に、万が一妊娠した可能性があると考えられた場合、直ちに受診してください。
- この薬は肝臓の機能を損なうことがありますので、服用前に肝臓の検査を受けてください。
服用中も定期的に肝臓の検査が行われることがあります。
- この薬は貧血を起こすことがありますので、服用前に血液検査を受けてください。
服用中も定期的に血液検査が行われる事があります。
(裏面もお読みください)

- この薬の効果が減弱する可能性があるので、セイヨウオトギリソウ（セント・ジョーンズ・ワート）を含む健康食品やハーブティーの飲食を避けてください。
- この薬には併用してはいけない薬や、併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。
- 飲み忘れた場合の対応
決して2回分を一度に飲まないでください。
気がついた時すぐに1回分飲んでください。
ただし、次の服用時間が間近の場合は1回とぼして、次の時間に1回分飲んでください。

この薬を使ったあと気をつけていただくこと

- 下記のような症状に気づいたときは、すぐに医師または薬剤師に連絡して下さい。
 - からだがだるい
 - めまい
 - 頭痛
 - 耳鳴り
 - 階段や坂をのぼる時の動悸や息切れの悪化
 - 息切れの悪化

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、主治医または薬剤師に相談してください。

連絡先（医療機関・薬局名）